

**Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -97/2008  
z dnia 12.12.2008 r.**

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie:**


**AGROPAK sp. j.** B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel./fax:  
(0-32) 61 56 330, 61 56 944, e-mail: agropak@agropak.com.pl

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka  
dla ludzi i środowiska**

## **Treol 770 EC**


Zawartość substancji aktywnej:  
**olej parafinowy – 770 g w 1 litrze środka.**

**Zezwolenie MRiRW Nr R-97/2008 z dnia 12.12.2008 r.**



*Drażniący*

Działa drażniąco na skórę.  
Działa szkodliwie na organizmy wodne.



**Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem**

### **I. OPIS DZIAŁANIA**

**TREOL 770 EC** jest środkiem owadobójczym i roztoczobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do ochrony drzew owocowych oraz świerka i modrzewia. Na szkodniki działa kontaktowo.

### **II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI**

#### **Rośliny sadownicze**

##### **1. JABŁOŃ, ŚLIWA**

przędziorek owocowiec.

Opryskiwać od fazy pęknięcia pąków do początków stadium "mysiego uszka", najlepiej na początku wylęgu larw z jaj zimowych, który zbiega się z fazą zielonego pąka kwiatowego jabłoni.

**Zalecane stężenie: 1,5%** (1,5 l środka w 100 litrach wody).

## **Rośliny ozdobne (w gruncie)**

### **2. ŚWIERK**

przedziorek sosnowiec (jaja zimowe)

Opryskiwać w okresie wczesnowiosennym do momentu ruszenia wegetacji.

**Zalecane stężenie: 1,5%.** (15 ml środka w 1 litrze wody).

### **3. MODRZEW**

ochojnik świerkowo-modrzewiowy (zimujące stadia - larwy).

Opryskiwać w okresie wczesnowiosennym do momentu ruszenia wegetacji.

**Zalecane stężenie: 1,5%.** (15 ml środka w 1 litrach wody).

### **UWAGI:**

1. Środek stosować w temperaturze powyżej 0°C, podczas pogody bezwietrznej i bezdeszczowej.
2. Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi

## **III. OKRES KARENCJI**

(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):

Jabłoń, śliwa, świerk, modrzew - **NIE DOTYCZY.**

## **IV. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT**

(okres zapobiegający zatruciu):

**NIE DOTYCZY.**

## **V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym miesadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w miesadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

## **VI. PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Chronić przed dziećmi

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

## **VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowanie traktować jako odpady komunalne.  
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

## **UWAGA**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeśli to możliwe, pokaż etykietę.

**ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.**

### **Pomoc medyczna**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 349 28 31

Kraków – (0-12) 411 99 99

Lublin – (0-81) 740 89 83

Łódź – (0-42) 657 99 00

Poznań – (0-61) 847 69 46

Rzeszów –(0-17) 866 40 25

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Tarnów (0-14) 631 51 77

Warszawa – (0-22) 619 66 54

Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....